

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZU (Yapraktan)
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte ve başaklanma başlangıcında 2 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Şeker Pancarı, Havuç, Soğan	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca ve 2. çapadan sonra 15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Fasulye, Bezelye	Ekimden 3 hafta sonra 10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	İlk tomurcuk, ilk çiçek başlangıcında, meyve halinde 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Şeftali, Kayısı, Elma, Kiraz, Erik, Armut	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde ve 10-15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Pamuk	Tarak yaprağı oluşumunda, çiçek açma aşamasında ve meyve oluşurken uygulanır.	80-100 gr / da
Lahana, Karnabahar	Dikimden 4-6 hafta sonra, 7-10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Mısır, Ayçiçeği	Bitki çiçek açmadan önce ve sonrasında çiçekte iken 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Mercimek, Nohut	Çiçeklenmeden önce ve sonra 2 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Bağ	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde dane teşekkülü başlayınca 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Antep Fıstığı	Çiçek döktükten 20-25 gün sonra meyve bağlama döneminden önce olmak üzere 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Zeytin	Çiçeklenmeden önce, ilk çiçek aşamasında ve çiçeklenmeden sonra 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Kimyon	3-4 çatal döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte kullanılabilir. Ekimden hasada kadar 3-4 defa uygulanabilir.	80-100 gr / da
Çilek	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcında ve sonrasında olmak üzere 3-4 defa uygulanabilir.	80-100 gr / da
Portakal	Meyve yanakları pembeleşmesini tamamlamadan önce 2 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Patates	Sap uzaması aşaması, tomurcuk ve çiçek aşamasında 3 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Tütün	Fide yastıktayken 1 defa, tarlaya alındıktan sonra 10 gün ara ile 2-3 defa uygulanır.	80-100 gr / da
Fındık	İlk uygulama meyve tutumu döneminde, daha sonraki uygulamalar 20 gün ara ile toplam 3-4 defa uygulanır.	80-100 gr / 100 lt
Süs Bitkileri	Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda 20-30 gün aralıklarla uygulama yapılır.	80-100 gr / 100 lt

Uygulama serin rüzgarsız ortamda yapılmalıdır. Aşırı sıcakta, yağmur öncesi ve sonrasında yapılmamalıdır. Combi Star kuvvetli alkaliiler dışında zirai mücadele ilaçları ile karıştırılabilir. Uygulama yapraklar ıslanmaya kadar ince zerrecikler halinde yapılır. Düşük doz ve sık uygulama önerilir.

Kullanılmadan önce ayrı bir kaptan ürünün iyice çözülmesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki miktarlar topraktan verildiği takdirde 1000-1500 gr / da' dır. Yukarıdaki miktarlar üreticiyi yönlendirmek amacı ile yapılan tavsiyelerdir. Bitkilerin büyüklük, küçüklük ve eksikliğin derecesine göre uygulanacak miktar artırılabilir veya azaltılabilir.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağım etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyorum.

ONAYLANMIŞTIR

 13.10.2010

COMBI STAR

**Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Çinko(Zn)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı**

GARANTİ EDİLEN ANALİZ (W / W):

Suda Çözünür Bor(B)-----%2
 Suda Çözünür Bakır(Cu)-----%1
 Suda Çözünür Demir(Fe)-----%2
 Suda Çözünür Mangan(Mn)-----%12
 Suda Çözünür Çinko(Zn)-----%6

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
 EVDE KULLANMAYINIZ
 ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
 MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
 SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ**

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

EC FERTİLİZER

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 Gübreyi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.
 Başka bir amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 3 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +40 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Gübrenin normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasıyla doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

FİRMA BEYANI:

Üretici firma; gübrenin uygun olmayan koşullarda muhafazası veya tavsiye dışı kullanımından doğacak zararlardan sorumlu değildir. Orijinal ambalajında satılmak şartı ile üretici firma ürünün kalitesini garanti eder.

Lisans No. 910
 Tescil No.
 Üretim Tarihi
 Son Kul. Tarihi
 Parti No.

Son Kullanma Tarihi, Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

TESCİL SAHİBİ FİRMA: :
 FEN TARIM ÜRÜNLERİ TİC: :
 Şafak Mah. 4260 Sok. No:21/5
 ANTALYA
 Tel: 0242 226 23 95

Net: 1 Kg.

**FEN TARIM UR. HAYV. VE SU ÜR.
 TİC. İTH. İHA. VE SAN. LTD. STİ**
 Şafak Mah. 4260 Sokak 21/5 ANTALYA
 Tel:0.242. 226 23 95 Fax:0.242 226 23 98
 Kurumlar D. 385 049 4736